



# Gebruik van de Ziektelastmeter COPD in de praktijk

Regien Kievits , april 2018



- Ca 100 huisartsen, 45 praktijken, 53 poh's
- Regio 's-Hertogenbosch
- Medicom grootste HIS
- April 2017 2 x scholing
- Alle huisartsen en poh's uitgenodigd
- 39 praktijkondersteuners, 4 huisartsen

## Mijn Luchtpunt

**Welkom bij Mijn Luchtpunt, een zelfmanagement programma voor COPD-patiënten.**

Je kunt hier een profiel aanmaken. Daarnaast is er de handige app waarmee je de status van je COPD kunt bij te houden met de zogenaamde COPD ziektelastmeter.

[Meer >](#)

SCHRIJF JE IN!

### Inloggen particulier

Email

Wachtwoord

LOGIN

[Ik ben mijn wachtwoord vergeten](#)



Niemand gebruikt 'm

# WAT IS HET PROBLEEM ?



# Hoe krijg je een verandering in praktijkvoering?



# Nodig voor gebruik Ziektelastmeter

- Richtlijnen (NHG-standaard COPD 2015)
- Scholing ([onderwijs@secretariaatcahag.nl](mailto:onderwijs@secretariaatcahag.nl))
- Facilitering HIS-KIS, patiëntenplatforms
- Indicatorreductie -> 1 Ziektelastindicator
- Géén kosten
- Stimulering (prestatie-afspraken, zorggroep)



# NHG-standaard COPD (concept 2018)

**Monitoring:**

**“Overweeg het gebruik van de ‘Ziektelastmeter COPD’ en beslis in samenspraak met de patiënt”**



# Kwaliteitsindicator Landelijke Benchmark InEen 2019

5. Percentage patiënten bij wie het functioneren is vastgelegd in de afgelopen 12 maanden – Zs 5.5	
Definitie	Percentage patiënten waarbij het functioneren van de patiënt middels een instrument voor het integraal meten van de ziektelast is vastgelegd in de afgelopen 12 maanden (volgens MmRC, CAT, CCQ, of RIQ-MON10) in combinatie met FEV1 (ooit) en longaanvalfrequentie afgelopen jaar, danwel door Ziektelastmeter COPD of NCSI.
Teller	Het aantal gediagnosticeerde COPD patiënten waarbij het functioneren middels een instrument voor het integraal meten van de ziektelast is vastgelegd in de afgelopen 12 maanden.
Noemer	Alle gediagnosticeerde COPD patiënten in de (praktijk)populatie.
Meetbaarheid	Voor deze kwaliteitsindicator geldt dat het noodzakelijk is bestanden van verschillende zorgverleners te koppelen. Op dit moment zijn de ICT mogelijkheden vaak nog te beperkt om dit te realiseren en zal er sprake zijn van een monodisciplinaire invulling van de indicator. Hieraan dient de komende tijd aandacht te worden besteed.
Benodigde data	Patiënten met diagnose COPD, patiënten met mMRC CCQ of RIQ-MON10 i.cm.FVE1 en longaanvalfrequentie of Ziektelastmeter COPD of NCSI
Beschikbaar	Ja
Bron	Patiëntdossier
Meetniveau	Geaggregeerd uit patiëntendossiers op niveau praktijk of multidisciplinair samenwerkingsverband

# Te doen



- Publiciteit vermelding ZL-meter in NHG standaard COPD
- Check/instructie ZL-meter in HIS/KIS ([www.cahag.nl](http://www.cahag.nl))
- Aanspreken kaderartsen/zorggroepen
- Scholing (ook POH-opleiding)
- ....

# Nu het juiste moment?

